Inferenzmethoden



Einheit 11

Termersetzungssysteme

1. Motivation und Grundbegriffe
2. Knuth-Bendix Vervollständigung
3. Narrowing
4. Unifikation durch Transformation

Termersetzung in der Deduktion

Effiziente Verarbeitung von Gleichheiten

- **Mechanismus zur Lösung des Wortproblems**
  - Wortproblem: Sind s und t gleich aufgrund der Axiome einer Theorie?
  - Methode: Vereinfachung der Ausdrücke bis textliche Identität erreicht
  - Hilfsmittel: Zielgerichtete Anwendung einer Menge von Gleichungen
- **Gleichheiten als Vereinfachung betrachtet**
  - Gleichheiten $a = b$ erhalten Richtung $a \rightarrow b$
  - Reduktion: Ersetzung von Teiltermen durch einfachere gleiche Terme
- **Eigenständiges Forschungsgebiet Rewriting**
  - Eigenschaften von Systemen syntaktischer Transformationsregeln
  - Verwendet eigene, z.T. abweichende Notationen
- **Vielfältige Anwendungen**
  - Integration in Theorembeweiser durch erweiterte Unifikationsalgorithmen
  - Mögliche Methode zur Implementierung von Theoriekonnektionen
  - Schlüssel für Unifikationstheorie, Logiksysteme, Berechnungsmodelle

Termersetzung am Beispiel der Gruppentheorie

- **Basisaxiome einer Gruppe mit Verknüpfung $\cdot$**

$$e \cdot x \doteq x \qquad \textit{linksseitiges Einselement}$$
$$x \cdot e \doteq x \qquad \textit{rechtsseitiges Einselement}$$
$$\overline{y} \cdot y \doteq e \qquad \textit{Linksinverses}$$
$$(u \cdot v) \cdot w \doteq u \cdot (v \cdot w) \qquad \textit{Assoziativität}$$

- **Als Reduktionsregeln**

$$\mathbf{r_1} \qquad e \cdot x \to x$$
$$\mathbf{r_2} \qquad x \cdot e \to x$$
$$\mathbf{r_3} \qquad \overline{y} \cdot y \to e$$
$$\mathbf{r_4} \qquad (u \cdot v) \cdot w \to u \cdot (v \cdot w)$$

- **Anwendung von Regeln zur Beweisführung**

$$(\overline{a} \cdot a) \cdot b \doteq (e \cdot \overline{a}) \cdot (a \cdot b)$$
$$\xrightarrow{r_1} \quad (\overline{a} \cdot a) \cdot b \doteq \overline{a} \cdot (a \cdot b)$$
$$\xrightarrow{r_4} \quad \overline{a} \cdot (a \cdot b) \doteq \overline{a} \cdot (a \cdot b)$$

Rewriting: Grundbegriffe

- **Termersetzungssystem $(\mathcal{A}, \mathcal{R})$**
  - $\mathcal{A}$ Alphabet, $\mathcal{R}$ Menge von Reduktionsregeln über $\mathcal{A}^*$
- **Reduktionsregel $t \to s$** (t, s Terme über $\mathcal{A}$)
  - t (Redex) keine Variable
  - Alle Variablen von s (Kontraktum) kommen in t vor
- **$u \xrightarrow{r} v$: Regelanwendung von $r = t \to s$ auf u**
  - Teiltermmatching: Bestimme Substitution σ, so daß $t\sigma$ Teilterm von u
  - Ersetzung: Ersetze $t\sigma$ durch $s\sigma$
- **$u \xrightarrow{*} w$: Iterierte Anwendung von Regeln**
  - $u \xrightarrow{*} u$ (ohne Anwendung von Regeln)
  - $u \xrightarrow{*} w$, falls es ein $v \in \mathcal{A}^*$ gibt mit $u \xrightarrow{r} v$ und $v \xrightarrow{*} w$
- **Normalform: nichtreduzierbarer Term**
  - Term v, der nicht durch Regelanwendungen "reduziert" werden kann
  - **Wert von u**: Normalform v mit $u \xrightarrow{*} v$

Anwendung der Termersetzungsregel $u \xrightarrow{r} v \quad (r = t \to s)$



Konfluenz

Ist die Normalform eines Terms eindeutig?

- **$a(\cdot\overline{a})\cdot b$ hat zwei Normalformen**
  - $(a\cdot\overline{a})\cdot b \xrightarrow{r_3} e\cdot b \xrightarrow{r_1} b$
  - $(a\cdot\overline{a})\cdot b \xrightarrow{r_4} a\cdot(\overline{a}\cdot b)$
  - Die Normalformen sind nicht weiter reduzierbar, aber verschieden
- **Konfluenz von $(\mathcal{A},\mathcal{R})$**
  - Ketten von Regelanwendungen sind immer zusammenführbar

    Aus $\boldsymbol{t\uparrow s}$ ($u \xrightarrow{*} t$ und $u \xrightarrow{*} s$ für ein u)

    folgt $\boldsymbol{t\downarrow s}$ ($t \xrightarrow{*} v$ und $s \xrightarrow{*} v$ für ein v)



  - Regeln entsprechen "echten" Gleichungen

    Gleiche Beweiskraft wie Anwendung der Gleichheiten

Das einfache Regelsystem für die Gruppentheorie ist nicht konfluent

Normalisierbarkeit

Hat jeder Term eine Normalform?

- **Regeln für Gruppentheorie sind unvollständig**
  - Gleichung der Assoziativität gilt in zwei Richtungen
  - Naive Lösung: Zusatzregel für Rückwärtsanwendung der Assoziativität

    $\mathbf{r_1}$ $\quad e \cdot x \to x$

    $\mathbf{r_2}$ $\quad x \cdot e \to x$

    $\mathbf{r_3}$ $\quad \overline{y} \cdot y \to e$

    $\mathbf{r_4}$ $\quad (u \cdot v) \cdot w \to u \cdot (v \cdot w)$

    $\mathbf{r_5}$ $\quad u \cdot (v \cdot w) \to (u \cdot v) \cdot w$
  - Reduktionskette $(a \cdot \overline{a}) \cdot b \overset{r_4}{\to} a \cdot (\overline{a} \cdot b) \overset{r_5}{\to} (a \cdot \overline{a}) \cdot b \overset{r_4}{\to} ..$ terminiert nicht
  - Normalform existiert dennoch: $(a \cdot \overline{a}) \cdot b \overset{r_3}{\to} e \cdot b \overset{r_1}{\to} \boldsymbol{b}$
- **Schwache Normalisierbarkeit**
  - Jeder Term besitzt eine Normalform
  - Der λ-Kalkül ist nicht schwach normalisierbar (z.B. $(\lambda x.x\,x)(\lambda x.x\,x)$)
- **Starke Normalisierbarkeit ($(\mathcal{A}, \mathcal{R})$ noethersch)**
  - Jede Kette von Regelanwendungen terminiert

Nachweis starker Normalisierbarkeit

Das System $r_1..r_4$ ist stark normalisierbar

- **Definiere wohlfundierte $\succ$ Ordnung auf $\mathcal{A}^*$**
  - z.B. lexikographische Ordnung: Länge und Ordnung im Alphabet
  - Sinnvolle Ordnung auf $\mathcal{A}$ ist z.B. $(\succ) \succ \cdot \succ z \succ ... \succ a$
- **Zeige, daß jede Regel $t \rightarrow s$ die Ordnung respektiert**
  - $r_1 : \; e \cdot x \succ x$
  - $r_2 : \; x \cdot e \succ x$
  - $r_3 : \; \overline{y} \cdot y \succ e$
  - $r_4 : \; (u \cdot v) \cdot w \succ u \cdot (v \cdot w)$
- **Konsequenz: Jede Reduktionsfolge terminiert**
  - Jede Reduktionsfolge liefert eine bzgl. $\succ$ absteigende Kette von Termen
  - Wohlfundiertheit von $\succ$: es gibt keine unendlichen absteigenden Ketten

Steuerung von Termersetzungsystemen

- **Vermeide nicht normalisierbare Regelsysteme**
  - Terme ohne Normalform sind für automatisches Schließen ungeeignet
  - λ-Kalkül ist Logik höherer Stufe und hochgradig unentscheidbar
- **Verwende heuristische Steuerung bei schwacher Normalisierbarkeit**
  - Strategische Steuerung vermeidet nichtterminierende Reduktionsketten
- **Konfluenz ist sehr wichtig**
  - Andernfalls wird Backtracking über Reduktionen erforderlich
    um Gleichheit von Termen nachzuweisen
- **Optimal: vollständige Termersetzungssysteme**
  - $(\mathcal{A}, \mathcal{R})$ noethersch und konfluent

Der Einsatz vollständiger Termersetzungssysteme führt immer zum Ziel!

Erzeugung vollständiger Regelsysteme

- **Ausgangspunkt: System von Gleichungen**
  - Axiomatische Beschreibung der Bedeutung von Termen einer Theorie
- **Transformiere Gleichungen in gerichtete Regeln**
  - Regel $t \to s$ ersetzt Gleichung $t = s$
  - Regel ist gerichtet: Anwendung in Gegenrichtung nicht möglich
- **Regeln sollen Gleichungen vollständig ersetzen**
  - Konfluenz kann durch Ausrichtung verloren gehen
  - Zusatzregel für Gegenrichtung würde starke Normalisierbarkeit zerstören
  - Verfahren zur Vervollständigung von Reduktionssystemen nötig
- **Superposition von Regeln r_i, r_j**
  - Unifiziere Teilterme der linken Seiten beider Regeln
  - Bilde kritischen Term t aus instantiierten Teiltermen
  - Bilde Termpaar s, s' mit $t \xrightarrow{r} s$ und $t \xrightarrow{r'} s'$:
  - Normalisiere s, s' in $(\mathcal{A}, \mathcal{R})$ zu kritischem Termpaar u, v
  - Falls $u \neq v$ bilde neue Regel $u \to v$ (bzw. $v \to u$, falls $v \succ u$)



Knuth Bendix Vervollständigung

Vervollständigung durch Superposition

- **Ausgangspunkt: noethersches Regelsystem**
  - i.a. einfache Umwandlung eines Gleichungssystems
- **Ziel: vollständiges Regelsystem**
- **Methode: schrittweise Superposition aller Regeln**
  - unter Verwendung einer wohlfundierten Termordnung $\succ$
- **Abbruchkriterium: lokale Konfluenz**
  - Je zwei Regelanwendungen sind zusammenführbar



- **Korrektheit:**
  - Starke Normalisierbarkeit: neue Regeln erhalten die Termordnung $\succ$
  - Konfluenz folgt aus lokaler Konfluenz und starker Normalisierbarkeit

Das Diamond Lemma

$\xrightarrow{r}$ stark normalisierbar, lokal konfluent $\Rightarrow$ $\xrightarrow{r}$ konfluent

- **Für jeden Term v gibt es ein n, so daß jede in v beginnende Reduktionsfolge in maximal n Schritten terminiert**
  - Stark normalisierbar: jede Reduktionsfolge von v terminiert
  - Endliche Verzweigung von $\xrightarrow{r}$: es gibt eine maximale Schrittzahl
- **Für alle v folgt $t{\downarrow}s$ aus $v \xrightarrow{*} t$ und $v \xrightarrow{*} s$**

  Induktion über maximale Länge n aller Reduktionsketten

  $n{=}0$: Es folgt $v{=}t{=}s$, also $t{\downarrow}s$ trivialerweise

  $n{+}1$: Falls $v \xrightarrow{0} t$ oder $v \xrightarrow{0} s$, dann $v{=}t$ oder $v{=}s$

  Ansonsten $v \xrightarrow{r} t_1 \xrightarrow{*} t$ und $v \xrightarrow{r} s_1 \xrightarrow{*} s$

  Lokale Konfluenz: $t_1{\downarrow}s_1$ mit einem Term z

  Induktionsannahme für t_1: $t_1 \xrightarrow{*} t$, $t_1 \xrightarrow{*} z$ also $t{\downarrow}z$ mit w

  Induktionsannahme für s_1: $s_1 \xrightarrow{*} z \xrightarrow{*} w$, $s_1 \xrightarrow{*} s$ also $w{\downarrow}s$ mit u

  Insgesamt $t \xrightarrow{*} w \xrightarrow{*} u$ und $s \xrightarrow{*} u$, also $\boldsymbol{t{\downarrow}s}$



Knuth–Bendix Verfahren

Eingabe: Endliche Menge $\mathcal{G}$ von Axiomgleichungen, Termordnung $\succ$.
Ausgabe: Bei Terminierung vollständiges Termersetzungssystem
oder Fehlermeldung

Initialisiere Regelmenge $\mathcal{R} := \emptyset$
Solange $\mathcal{G}$ nicht leer
  Wähle Gleichung aus $\mathcal{G}$ und reduziere sie mit Regeln aus $\mathcal{R}$
  Falls reduzierte Gleichung nicht von der Form $x \doteq x$
  Dann Falls reduzierte Gleichung läßt sich nicht mit $\succ$ zu neuer Regel richten
    Dann Abbruch '*Termordnung nicht ausreichend*'
    Sonst Bilde neue Regel und füge sie zu $\mathcal{R}$ hinzu;
      Reduziere alle Regeln aus $\mathcal{R}$ untereinander;
      Falls eine der reduzierten Regeln die Termordnung $\succ$ verletzt
      Dann entferne sie aus $\mathcal{R}$ und
        nehme sie in $\mathcal{G}$ auf, sofern sie nicht von der Gestalt $x \doteq x$ ist;
      Bilde alle kritischen Paare zwischen der neuen Regel
      und den übrigen Regeln und füge sie als Gleichungen zu $\mathcal{G}$ hinzu
Ergebnis $\mathcal{R}$

Knuth Bendix Vervollständigung am Beispiel

- **Vollständiges Regelsystem für die Gruppentheorie**

$\mathbf{r_1}$	$e \cdot x \longrightarrow x$	
$\mathbf{r_2}$	$x \cdot e \longrightarrow x$	
$\mathbf{r_3}$	$\overline{x} \cdot x \longrightarrow e$	
$\mathbf{r_4}$	$(x \cdot y) \cdot z \longrightarrow x \cdot (y \cdot z)$	
$\mathbf{r_5}$	$\overline{e} \longrightarrow e$	Superposition von r_2 und r_3
$\mathbf{r_6}$	$\overline{x} \cdot (x \cdot y) \longrightarrow y$	Superposition von r_3 und r_4
$\mathbf{r_7}$	$\overline{\overline{x}} \longrightarrow x$	Superposition von r_3 und r_6
$\mathbf{r_8}$	$x \cdot \overline{x} \longrightarrow e$	Superposition von r_3 und r_7
$\mathbf{r_9}$	$x \cdot (\overline{x} \cdot y) \longrightarrow y$	Superposition von r_6 und r_7
$\mathbf{r_{10}}$	$\overline{(x \cdot y)} \longrightarrow \overline{y} \cdot \overline{x}$	Superposition von r_4, r_6, r_8, r_9 (aufwendig)

Theorieunifikation mit Termersetzung

- **Komplementarität von Theoriekonnektionen**



  – Konnektion benutzt Theorieunifikation für Gruppentheorie

- **Unifikation von $R(z{\cdot}(\overline{c}{\cdot}c), z{\cdot}(\overline{z}{\cdot}b))^F$ und $R(c,b)^T$**

$$
\begin{aligned}
& R(z{\cdot}(\overline{c}{\cdot}c), z{\cdot}(\overline{z}{\cdot}b)) = R(c,b) \\
\xrightarrow{r_3}\ & R(z{\cdot}e, z{\cdot}(\overline{z}{\cdot}b)) = R(c,b) \\
\xrightarrow{r_9}\ & R(z{\cdot}e, b) = R(c,b) \\
\xrightarrow{r_2}\ & R(z,b) = R(c,b) \\
\xrightarrow{unif}\ & R(c,b) = R(c,b) \qquad \sigma{=}[c/z]
\end{aligned}
$$

- **Integriere Unifikation und Termersetzung**

  – Bestimme Substitution während der Ersetzung

Verallgemeinerte Anwendung von Rewrite-Regeln

- **Rewriting einer Gleichung mit der Regel $t \to s$:**

  $u = w \quad \to \quad v = w$

  v entsteht aus u durch Ersetzung eines Teilterms $t\sigma$ mit $s\sigma$



- **Einfaches Verengen mit der Regel $t \to s$:**

  $u = w, E \quad \to \quad v = w, E$

  v entsteht aus u durch Ersetzung eines Teilterms $t\sigma$ mit s und anschließender Anwendung von σ auf den ganzen Term



- **Lässiges Verengen mit der Regel $f t_1 \ldots t_n \to s$:**

  $u = w,\ E \quad \to \quad v = w,\ u_1 = t_1, \ldots, u_n = t_n,\ E$

  v entsteht aus u durch Ersetzung des Auftretens von $f u_1 \ldots u_n$ durch s.

  Bestimmung der Substitution wird in Gleichungssystem verschoben

  Verengen + Martelli–Montanari–Regeln liefert vollständiges (Unifikations-) Verfahren für Lösung einer Menge von Gleichungen unter einer Theorie

Termersetzungssystem für einfache Arithmetik

Arithmetische Regeln für ganze Zahlen

$\mathbf{r_1}$	$v(n(x)) \to x$	Vorgänger/Nachfolger
$\mathbf{r_2}$	$0 + x \to x$	Null als Linksidentität
$\mathbf{r_3}$	$x + 0 \to x$	Null als Rechtsidentität
$\mathbf{r_4}$	$n(x) + y \to n(x + y)$	Addition links
$\mathbf{r_5}$	$x + n(y) \to n(x + y)$	Addition rechts
$\mathbf{r_6}$	$x + v(y) \to v(x + y)$	Subtraktion

Martelli–Montanari–Regeln

Termdekomposition	$\{f(s_1, ..s_n) \doteq f(t_1, ..t_n)\} \cup E \to \{s_1 \doteq t_1, ..s_n \doteq t_n\} \cup E$	
Ausdünnen	$\{x \doteq x\} \cup E \to E$	
Umstellung	$\{t \doteq x\} \cup E \to \{x \doteq t\} \cup E$	$(t \notin \mathcal{V})$
Variablenelimination	$\{x \doteq t\} \cup E \to \{x \doteq t\} \cup E\{x \backslash t\}$	$(x \notin t,\ x \in E)$

Theorie-Unifikation durch Transformation

Gleichungen	angewandte Regeln
$(x + x) + v(0) = n(0)$	
$v(x_1 + y_1) = n(0),\ x_1 = x + x,\ v(y_1) = v(0)$	lässige Verengung mit r_6
$v(x_1 + y_1) = n(0),\ x_1 = x + x,\ y_1 = 0$	Termdekomposition
$v(x_1 + 0) = n(0),\ x_1 = x + x$	Variablenelimination $y_1 = 0$
$v((x + x) + 0) = n(0)$	Variablenelimination $x_1 = x + x$
$x_2 = n(0),\ n(x_2) = (x + x) + 0$	lässige Verengung mit r_1
$x_2 = n(0),\ n(x_2) = x_3,\ x_3 = x + x,\ 0 = 0$	lässige Verengung mit r_3
$x_2 = n(0),\ n(x_2) = x_3,\ x_3 = x + x$	Ausdünnung $0 = 0$
$x_2 = n(0),\ n(x_2) = x + x$	Variablenelimination $x_3 = x + x$
$x_2 = n(0),\ n(x_2) = n(x_4 + y_4),\ x = n(x_4),\ x = y_4$	lässige Verengung mit r_4
$n(n(0)) = n(x_4 + y_4),\ x = n(x_4),\ x = y_4$	Variablenelimination $x_2 = n(0)$
$n(0) = x_4 + y_4,\ x = n(x_4),\ x = y_4$	Termdekomposition
$n(0) = x_4 + y_4,\ y_4 = n(x_4)$	Variablenelimination $x = y_4$
$n(0) = x_4 + n(x_4)$	Variablenelimination $y_4 = n(x_4)$
$n(0) = n(x_5 + y_5),\ x_4 = x_5,\ n(x_4) = n(y_5)$	lässige Verengung mit r_5
$n(0) = n(x_5 + y_5),\ n(x_5) = n(y_5)$	Variablenelimination $x_4 = x_5$
$0 = x_5 + y_5,\ n(x_5) = n(y_5)$	Termdekomposition
$0 = x_5 + y_5,\ x_5 = y_5$	Termdekomposition
$0 = y_5 + y_5$	Variablenelimination $x_5 = y_5$
$0 = x_6,\ y_5 = 0,\ y_5 = x_6$	lässige Verengung mit r_2
$0 = x_6,\ 0 = x_6$	Variablenelimination $y_5 = 0$
$0 = x_6,\ x_6 = 0$	Umstellung
$0 = 0$	Variablenelimination $x_6 = 0$

$$\boldsymbol{\sigma(x) = n(0)}$$

Anwendung von Termersetzung in der Deduktion

- **Unifikationsalgorithmus für Theoriekonnektionen**
  - Nur bei vollständigen Regelsystemen möglich

    z.B. Einfache Arithmetik, Gruppentheorie, Gleichheitstheorien
  - Nicht jede Theorie kann als vollstandiges Regelsystem formuliert werden
  - Heuristische Steuerung für unvollständige Systeme praktisch erfolgreich
- **Deduktion als Termersetzungssystem formulierbar**
  - In beschränkten Bereichen sinnvoll einsetzbar
  - Niedriges Niveau, kein Ersatz für verdichtete logische Verfahren